سالک



* به پشت صفحه مراجعه شود

عامل بیماری: انواع انگلهای لیشمانیا (لیشمانیا تروپیکا =عامل لیشمانیوزیس خشک ؛ لیشمانیا ماژور = عامل لیشمانیوزیس مرطوب)

درمان

درمان با تزریق آمپول گلوکانتیم به دو روش سیستمیک و موضعی صورت می پذیرد.

انتخاب روش درمان بر اساس نوع ، تعداد و محل زخم و ...

درمان موضعی : تا بهبودی کامل ضایعه یا حد اکثر ۱۲ هفته

*** تزریق موضعی :** هفته ای یک بار +

*** کرایوتراپی:** هر دو هفته یکبار

نکته : در صورت همزمانی تزریق و کرایوتراپی ؛ ابتدا کرایوتراپی ، سپس تزریق موضعی انجام شود .

درمان سیستمیک : یک آمپول به ازای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن و حداکثر سه آمپول در روز (که می توان در موارد خاص دارو را دو وعده در روز تجویز کرد)

* در سالک مرطوب : برای ۲ هفته

* در سالک خشک : برای ۳ هفته

شکست یا عود

درمان سیستمیک:

* در سالک مرطوب : برای ۲ هفته

* در سالک خشک : برای ۳ هفته

شکست یا عود

۶-۴ هفته تأخیر و عدم درمان

(فقط مراقبت از زخم بیمار)

شروع درمان سیستمیک نوبت دوم با همان دوز قبلی

* در سالک مرطوب : برای ۲ هفته

* در سالک خشک : برای ۳ هفته

شکست یا عود

||

مقاومت بالینی

ارجاع به متخصص پوست