هیداتیدوز


گزارش مورد مبتلا به کیست هیداتید
تکمیل فرم همه گیرشناسی بیماری سالک
(خلاصه اطلاعات و بررسی انفرادی)
بررسی های همه گیرشناسی
آیا بیمار بومی است؟
خیر
گزارش به مرکز بهداشت استان
بلی
جستجوی منبع احتمالی آلودگی
(سگ و سگسانان ، سبزیجات)
گزارش به :
❊ مرکز بهداشت استان
❊ مرکز مدیریت بیماریها (از طریق برنامه نرم افزاری در ابتدای ماه بعد توسط مرکز بهداشت استان)
انجام اقدامات کنترلی
با هماهنگی با مرکز بهداشت استان
انجام برنامه های مداخله ای از
قبیل: آبیاری سالم سبزیکاریها ،
اتلاف سگها و گربه های ولگرد
و ...
آموزش جامعه
هماهنگی با :
❊ دامپزشکی و جهاد کشاورزی و...
❊ فرمانداری ، بخشداری ، شهرداری و مسئولین محلی
❊ بهداشت محیط
کنترل بیماری

عامل بیماری: اکینوکوکوس گرانولوزوس (جزء دسته ی کرمهای نواری است).

علائم بیماری :

❋ دوره ی کمون : ۲۰-۵ سال

❋ علائم بیماری شبیه به علائم توموری با رشد آرام می باشد که بستگی به محل استقرار کیست دارد:

- برخی انواعِ کیست هیداتیک، بخصوص کیست کبدی، در موقع تشخیص، علائم بالینی از خود نشان نمی دهد و کیستها بر حسب اتفاق، در ضمنِ انجام پرتونگاریهای متداول (عکس و رادیوگرافی) تشخیص داده می شوند.
- کیستهای ریوی باعث بروز علائمی شبیه حساسیت می شوند؛ خلط خونی، سرفه، تنگی نفس، دردهای گذرای قفسه ی سینه، تپش قلب، افزایش ضربان قلب و خارش از جمله ی این حساسیتها می باشند.
- کیستهای مغزی ، علائم فشار داخل جمجمه ای ، صرع (جَکسونی) و یا کوری
- کیست کلیوی می تواند منجر به تب متناوب، خون در ادرار و اختلال عمل کلیوی و در صورت پارگی کیست باعث حضور مواد هیداتید در ادرار شود.
- کیست طحال ممکن است باعث درد مبهم و بالا آمدن دنده ها شود .
- تشکیل کیست های ثانویه ؛ خود بر حسب محل تشکیل کیست ثانویه، علائمی را در بر دارد: تظاهرات حساسیتی بصورت بُثورات کَهیر مانند و خارش، تب نا منظم ، اختلالات معدی- روده ای، درد شکم، سیانوز(سیاه شدن در اثر خونمردگی)،ایست قلبی و هذیان ، علائم شدید آنافیلاکتیک(حساسیتی) و حتی مرگ ناگهانی از عوارض دیگرکیستهای ثانویه، یرقان متناوب و آبسه های مزمن می باشد.

کیستهای موجود

درمان : دارو درمانی (مبندازول ، آلبندازول و ...) ؛ یا جراحی و برداشتن کیست